

## やまいのはなし

2018年9月号

内科・循環器内科・リハビリテーション科

### 森 医 院

<http://www.moriiin.com/>

〒500-8322 岐阜県岐阜市香取町 3-48 TEL : 058-251-4452

#### 院長のブログ

<http://blog.livedoor.jp/moriiin5656/>

ケータイ版はこちら→



診療時間	月	火	水	木	金	土	日
午前 9:00~12:00	○	○	○	○	○	○	/
午後 4:00~ 7:00	○	○	○	/	○	/	/

Pickup!

### 抗血小板薬と抗凝固薬

血管に傷が付くと出血が起こります。これを止めるために、まず傷口に血小板が集まり、傷口を仮止めして止血します。これを一次止血といいます。この止血をより強固なものにするため、血液中のフィブリノゲンという物質が、フィブリンという糊状の物質に変化して、さらに傷口を覆います。これを二次止血といいます。

アスピリン（バイアスピリン®）、クロピドグレル（プラビックス®）、シロスタゾール（プレタール®）などの抗血小板薬は、この一次止血を抑制することで、脳血栓を予防します。

一方、ワルファリン、リクシアナ®、エリキュース®などの抗凝固薬は、二次止血を抑制することで、脳塞栓を予防します。