## 内科・循環器内科・リハビリテーション科

森医院

http://www.moriiin.com/

〒500-8322 岐阜県岐阜市香取町 3-48 TEL: 058-251-4452

院長のブログ

http://blog.livedoor.jp/moriiin5656/ケータイ版はこちら→



診療時間	月	火	水	木	金	±	B
午前 9:00~12:00	0	0	0	0	0	0	/
午後 4:00~ 7:00	0	0	0	/	0	/	/

## 森医院通信



2018年6月号

(25)桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

構成生薬 桂皮, 茯苓, 牡丹皮, 芍薬, 桃仁 体格はしっかりしていて赤ら顔が多く、腹部は大体充実、下腹部に抵抗のあるものの次の諸症:子宮並びにその付属器の炎症、子宮内膜炎、月経不順、月経困難、帯下、更年期障害(頭痛、めまい、のぼせ、肩こり等)、冷え症、腹膜炎、打撲症、痔疾患、睾丸炎

お けつざい

駆於血剤の代表的方剤です。於血は血が停滞している状態をさします。 つまり、打撲によるタンコブや青あざ、静脈瘤や痔核もそうですし、女性の 月経に関連する現象も於血です。桂枝茯苓丸は、これらの状態を和らげる 作用を有します。

駆於血剤を使用する一つの指標として、小腹硬満があります。これは、ヘソの 斜め下で、足の付け根との真ん中くらいに圧痛を認めるものです。右だと 丁度、虫垂炎の時に痛みがある場所です。手術ができない昔は、虫垂炎も 於血として、駆於血剤を使っていたそうです。