

やまいのほなし

2020年2月号

内科・循環器内科・リハビリテーション科

森 医 院

<http://www.moriiin.com/>

〒500-8322 岐阜県岐阜市香取町 3-48 TEL : 058-251-4452

院長のブログ

<http://blog.livedoor.jp/moriiin5656/>

ケータイ版はこちら→



診療時間	月	火	水	木	金	土	日
午前 9:00~12:00	○	○	○	○	○	○	/
午後 4:00~ 7:00	○	○	○	/	○	/	/

Pickup!

骨粗鬆症の診断

骨粗鬆症の診断には骨塩定量検査が必要です。
検査法は以下の3種で、それぞれ長所と短所があります。

DXA法	どの部位の測定も可能で、骨粗鬆症の診断精度に優れる。また、骨粗鬆症治療薬の効果判定にも有用である。しかし、限られた施設にしか設置されておらず、診察予約をしないと使えない。
MD法	X線で手の写真を撮れば測定ができるので、非常に簡単に骨粗鬆症の診断が可能である。しかし治療の効果判定には用いることができない。
QUS法	X線を用いないので安全であり、スクリーニング検査として有用である。しかし、検査値バラツキが大きいため、診断には向かない。

いずれの方法においても、骨塩量が若年成人の平均値と比べて70%未満の場合を骨粗鬆症と診断します。