



図①

アムスラー検査

正常な見え方




加齢黄斑変性症の場合の見え方




図②

加齢黄斑変性症



正常の OCT



新生血管と浮腫で網膜が歪んでいる。

内科・循環器内科・リハビリテーション科

森 医 院

<http://www.moriiin.com/>

〒500-8322 岐阜県岐阜市香取町 3-48 TEL : 058-251-4452

院長のブログ

<http://blog.livedoor.jp/moriiin5656/>

ケータイ版はこちら→



診療時間	月	火	水	木	金	土	日
午前 9:00~12:00	○	○	○	○	○	○	/
午後 4:00~ 7:00	○	○	○	/	○	/	/

森医院通信

やまいのほなし

2025年10月号

Pickup!

目のしくみと黄斑

眼は、カメラに例えられますが、眼の内側に網膜というフィルムにあたる膜があります。網膜には、視細胞という物を見るための細胞がぎっしり並んでいます。網膜の中心部は黄斑とよばれ、直径1.5mm～2mm 程度の小さな部分です。黄斑の中心は中心窩と呼ばれ、特別な構造になっており、細かいものを識別したり、色を見分ける働きを持つ網膜の中で一番大切な場所です。黄斑では大変良い視力が得られますが、それ以外のところでは正常の目でも十分良い視力は得られません。したがって、黄斑は大変小さな部分ですが、黄斑が障害されるとそれ以外に網膜に異常がなくても視力が著しく低下します。

